

**Twierdzenie 1.** Niech funkcje  $f, g$  będą całkowalne na  $[a, b]$ . Wówczas:

1.  $\int_a^b (f(x) \pm g(x))dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx,$
2.  $\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx,$
3.  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$  dla dowolnego  $c \in [a, b],$
4. Jeżeli  $f(x) \leq g(x)$  dla każdego  $x \in [a, b],$  to  $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$

Przykłady: 1. 1.  $\int_0^2 |1 - x^2|dx,$  2. Wykazać, że  $\int_0^1 e^{-x^2} dx > \frac{e-1}{e}$

### Podstawienie w całce oznaczonej

**Twierdzenie 2.** Jeżeli:

1.  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$  ma ciągłą pochodną na  $[\alpha, \beta],$
2.  $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b,$
3. funkcja  $f$  jest ciągła na  $[a, b],$  to

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

Przykłady: 2. 1.  $\int_0^2 \sqrt{4 - x^2}dx$

2.  $\int_0^1 x\sqrt{1+x}dx$

**Definicja 1.** Wartością średnią funkcji  $f$  całkowalnej na przedziale  $[a, b]$  nazywamy liczbę

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$

**Twierdzenie 3** (Całkowe o wartości średniej). Jeżeli  $f$  jest ciągła na  $[a, b],$  to istnieje  $c \in [a, b],$  taka że

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(c).$$

*Przykład:* 1. Ładunek elektryczny  $E$  działa siłą  $f(x) = c\frac{E}{x^2}$  na ładunek  $e$  znajdujący się w odległości  $x$ . Skutkiem tego działania jest przesunięcie ładunku  $e$  po linii prostej przechodzącej przez punkt o ładunku  $E$  z odległości  $a$  do  $b$  ( $b > a$ ). Obliczyć wykonaną pracę przy tym przesunięciu i średnią wartość siły na odcinku  $[a, b]$ .

- Jeżeli  $f$  ma ciągłą pochodną na  $[a, b]$ , to długość łuku krzywej  $\Gamma = \{(x, f(x)) : x \in [a, b]\}$  wyraża się wzorem:

$$|\Gamma| = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Przykład:  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$  dla  $x \in [0, \frac{1}{2}]$ .

- Objętość bryły powstałej w wyniku obrotu dokoła  $Ox$  obszaru ograniczonego osią  $Ox$  i wykresem funkcji  $f$  całkowalnej na  $[a, b]$ :

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Przykład:  $f(x) = \sin x$ ,  $x \in [0, \pi]$ .

- Pole powierzchni powstałej w wyniku obrotu dokoła  $Ox$  wykresu funkcji  $f$  (o ciągłej pochodnej) dla  $x \in [a, b]$ :

$$|\Sigma| = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Przykład:  $f(x) = x^3$ ,  $x \in [0, 1]$ .

### Całki niewłaściwe

**Definicja 2.** Dla  $f$  określonej na  $[a, \infty]$  lub  $[-\infty, b]$  całkę określamy wzorem:

$$\int_a^\infty f(x) dx := \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

lub odpowiednio

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx := \lim_{s \rightarrow -\infty} \int_s^b f(x) dx.$$

Ponadto

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx := \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^\infty f(x) dx.$$

*Przykłady:* 3. 1.  $\int_2^\infty \frac{dx}{x^2}$

$$2. \int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$3. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{4+x^2}$$

**Wn. 1.**  $\int_a^{\infty} \frac{dx}{x^p}$  jest zbieżna gdy  $p > 1$  i rozbieżna gdy  $p \leq 1$ .

**Definicja 3.** Dla  $f$  ciągłej i nieograniczonej na  $[a, b)$  lub  $(a, b]$  całkę określamy wzorem:

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$$

lub odpowiednio

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{s \rightarrow a^+} \int_s^b f(x)dx.$$

**Wn. 2.**  $\int_0^b \frac{dx}{x^p}$  jest zbieżna gdy  $p < 1$  i rozbieżna gdy  $p \geq 1$ .

*Przykład: 2.*  $\int_0^e \ln x dx$ .